疾患名	レジメン名称	インターバル日数	薬剤名称	標準値(1回量)	単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14	Day 15	Day 16	Day 17	Day 18	Day 19	Day 20	Day 21
胃がん	(胃)CPT-11/TS-1療法	28	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液｢ｻﾜｲ｣(40mg、100mg)	0	mg/m2	○														○						
			エスワンタイホウOD錠T(20mg、25mg)	40 (<1.25m^2) 50 (1.25-1.5m^2) 60 (1.5m^2≦) 1日2回	mg	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服
胃がん	【胃】3Weekly-nabPTX療法	21	【特生】アブラキサン点滴静注用 100mg	260	mg/m2	○							○							○						
胃がん	【胃】ｲﾘﾉﾃｶﾝ+ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ療法(1コース目)	28	サイラムザ点滴静注液100mg (100、500mg)	8	mg/Kg	○																				
			サイラムザ点滴静注液100mg (100、500mg)	8	mg/Kg															○						
			ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液｢ｻﾜｲ｣(40mg、100mg)	150	mg/m2	○														○						
胃がん	【胃】ｲﾘﾉﾃｶﾝ+ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ療法(2コース目以降)	28	サイラムザ点滴静注液100mg (100、500mg)	8	mg/Kg	○														○						
			ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液｢ｻﾜｲ｣(40mg、100mg)	150	mg/m2	○														○						
胃がん	【胃】ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ/XP(1ｻｲｸﾙ)	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
			トラスツズマブBS点滴静注用 (60、150mg)	8	mg/Kg	○																				
			エスワンタイホウOD錠T(20mg、25mg)	40 (<1.25m^2) 50 (1.25-1.5m^2) 60 (1.5m^2≦) 1日2回	mg	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服							
胃がん	【胃】ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ/XP(2ｻｲｸﾙ以降)	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
			トラスツズマブBS点滴静注用 (60、150mg)	6	mg/Kg	○																				
			エスワンタイホウOD錠T(20mg、25mg)	40 (<1.25m^2) 50 (1.25-1.5m^2) 60 (1.5m^2≦) 1日2回	mg	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服							
胃がん	【胃】G-SOX(130mg)療法	21	(後発)ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液(50、100、200mg)｢ｻﾜｲ｣	130	mg/m2	○																				
			エスワンタイホウOD錠T(20mg、25mg)	40 (<1.25m^2) 50 (1.25-1.5m^2) 60 (1.5m^2≦) 1日2回	mg	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服							
胃がん	【胃】CapeOX療法	21	(後発)ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液(50、100、200mg)｢ｻﾜｲ｣	130	mg/m2	○																				
			カペシタビン錠300mg｢ｻﾜｲ｣	1000	mg/m2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
胃がん	【胃】ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ/G-SOX療法(1コース目)	21	トラスツズマブBS点滴静注用 (60、150mg)	8	mg/Kg	○																				
			(後発)ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液(50、100、200mg)｢ｻﾜｲ｣	130	mg/m2	○																				
			エスワンタイホウOD錠T(20mg、25mg)	40 (<1.25m^2) 50 (1.25-1.5m^2) 60 (1.5m^2≦) 1日2回	mg	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服							
胃がん	【胃】ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ/G-SOX療法(2コース目以降)	21	トラスツズマブBS点滴静注用 (60、150mg)	6	mg/Kg	○																				
			(後発)ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液(50、100、200mg)｢ｻﾜｲ｣	130	mg/m2	○																				
			エスワンタイホウOD錠T(20mg、25mg)	40 (<1.25m^2) 50 (1.25-1.5m^2) 60 (1.5m^2≦) 1日2回	mg	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服							
胃がん	【胃】ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ/CapeOX療法(1コース目)	21	トラスツズマブBS点滴静注用 (60、150mg)	8	mg/Kg	○																				
			(後発)ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液(50、100、200mg)｢ｻﾜｲ｣	130	mg/m2	○																				
			カペシタビン錠300mg｢ｻﾜｲ｣	1000	mg/m2	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服							
胃がん	【胃】ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ/CapeOX療法(2コース目以降)	21	トラスツズマブBS点滴静注用 (60、150mg)	6	mg/Kg	○																				
			(後発)ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液(50、100、200mg)｢ｻﾜｲ｣	130	mg/m2	○																				
			カペシタビン錠300mg｢ｻﾜｲ｣	1000	mg/m2	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服							
胃がん	【胃】W- PTX+ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ療法(2コース目以降)	28	(運)ﾊｸﾘﾀｷｾﾙ点滴静注液｢ﾎｽﾋﾟｰﾗ｣(30、100mg)	80	mg/m2	○							○							○						
			サイラムザ点滴静注液100mg (100、500mg)	8	mg/Kg	○														○						
胃がん	(胃)Biweeklyﾄﾞｾﾀｷｾﾙ(TXT)	28	ドセタキセル点滴静注｢ﾆﾌﾟﾛ｣(20、80mg)	40	mg	○														○						
	(胃)腹腔内TXT	7	ドセタキセル点滴静注｢ﾆﾌﾟﾛ｣(20、80mg)	40	mg	○																				
胃がん	【胃】TS-1+ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	21	ドセタキセル点滴静注｢ﾆﾌﾟﾛ｣(20、80mg)	40	mg/m2	○																				
			エスワンタイホウOD錠T(20mg、25mg)	40 (<1.25m^2) 50 (1.25-1.5m^2) 60 (1.5m^2≦) 1日2回	mg	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服							
胃がん	【胃】nab- PTX+ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ療法(1コース目)	28	サイラムザ点滴静注液100mg (100、500mg)	8	mg/Kg	○														○						
			【特生】アブラキサン点滴静注用 100mg	100	mg/m2	○							○							○						
			サイラムザ点滴静注液100mg (100、500mg)	8	mg/Kg															○						
胃がん	【胃】nab- PTX+ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ療法(2コース目以降)	28	【特生】アブラキサン点滴静注用 100mg	100	mg/m2	○							○							○						
			サイラムザ点滴静注液100mg (100、500mg)	8	mg/Kg	○														○						
胃がん	【胃】W- PTX+ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ療法(1コース目)	28	(運)ﾊｸﾘﾀｷｾﾙ点滴静注液｢ﾎｽﾋﾟｰﾗ｣(30、100mg)	80	mg/m2	○							○							○						
			サイラムザ点滴静注液100mg (100、500mg)	8	mg/Kg	○																				
			サイラムザ点滴静注液100mg (100、500mg)	8	mg/Kg															○						
食道がん	(食)Docetaxel/Nedaplatin	28	ドセタキセル点滴静注｢ﾆﾌﾟﾛ｣(20、80mg)	30	mg/m2	○														○						
			アクプラ静注用(10、50mg)	40	mg/m2	○														○						
大腸がん	(大腸)(院内)肝動注 WH 5-FU×1週	7	フルオロウラシル注｢ﾄｰﾜ｣(250、1000mg)	1000	mg	○																				
大腸がん	☆【大腸】IRIS+Bev(1ｸｰﾙ目)	28	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液｢ｻﾜｲ｣(40mg、100mg)	100	mg/m2	○														○						
			ベバシズマブBS点滴静注 (100、400mg)｢第一三共｣	5	mg/Kg	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注 (100、400mg)｢第一三共｣	5	mg/Kg															○						
			エスワンタイホウOD錠T(20mg、25mg)	40 (<1.25m^2) 50 (1.25-1.5m^2) 60 (1.5m^2≦) 1日2回	mg	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服							
大腸がん	☆【大腸】IRIS+Bev(2ｸｰﾙ目以降)	28	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液｢ｻﾜｲ｣(40mg、100mg)	100	mg/m2	○														○						
			ベバシズマブBS点滴静注 (100、400mg)｢第一三共｣	5	mg/Kg	○														○						
			エスワンタイホウOD錠T(20mg、25mg)	40 (<1.25m^2) 50 (1.25-1.5m^2) 60 (1.5m^2≦) 1日2回	mg	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服							
大腸がん	【大腸】ﾛﾝｻｰﾌ+BEV療法(2回目以降)	28	ベバシズマブBS点滴静注 (100、400mg)｢第一三共｣	5	mg/Kg	○														○						
			ロンサーフ配合錠T(15、25mg)	35	mg/m2	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○									
大腸がん	【大腸】ﾛﾝｻｰﾌ+BEV療法(初回)	28	ベバシズマブBS点滴静注 (100、400mg)｢第一三共｣	5	mg/Kg	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注 (100、400mg)｢第一三共｣	5	mg/Kg															○						
			ロンサーフ配合錠T(15、25mg)	35	mg/m2	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○									
	ダカルバジン(カルチノイド用)	28	ダカルバジン注用 100mg	250	mg/m2	○	○	○	○	○																
膵癌	【消内】GEM療法	7	(運)ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ点滴静注用 (200mg、1g)	1000	mg/m2	○																				

疾患名	レジメン名称	インターバル日数	薬剤名称	標準値(1回量)	単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14	Day 15	Day 16	Day 17	Day 18	Day 19	Day 20	Day 21
肝細胞癌	Low dose 5-FU+CDDP（入院用）	5	フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」(250、1000mg)	250	mg	○	○	○	○	○																
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	10	mg	○	○	○	○	○																
肝細胞癌	Low dose 5-FU+CDDP（外来用）	7	フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」(250、1000mg)	250	mg	○																				
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	10	mg	○																				
神経内分泌腫瘍	【NEC】IP療法	28	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	60	mg/m2	○																				
			ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液「ｻﾜｲ」(40mg、100mg)	60	mg/m2	○							○							○						
神経内分泌腫瘍	【NEC】IP療法（Short Hydration）	28	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液「ｻﾜｲ」(40mg、100mg)	60	mg/m2	○							○							○						
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	60	mg/m2	○																				
神経内分泌腫瘍	【NEC】PE療法	21	エトポシド点滴静注液100mg「ｻﾝﾄﾞ」5ml	100	mg/m2	○	○	○																		
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
神経内分泌腫瘍	【NEC】PE療法（Short Hydration）	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
			エトポシド点滴静注液100mg「ｻﾝﾄﾞ」5ml	100	mg/m2	○	○	○																		
胃がん	【胃】MTX／5-FU療法	7	<新2>メソトレキセート注 50mg	100	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」(250、1000mg)	600	mg/m2	○																				
食道がん	(食)Nedaplatin+5FU	28	フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」(250、1000mg)	800	mg/m2	○	○	○	○	○																
			アクプラ静注用(10、50mg)	90	mg/m2	○																				
食道がん	(食)Docetaxel	21	ドセタキセル点滴静注「ﾆﾌﾛ」(20,80mg)	70	mg/m2	○																				

疾患名	レジメン名称	インターバル日数	薬剤名称	標準値(1回量)	単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14	Day 15	Day 16	Day 17	Day 18	Day 19	Day 20	Day 21
NET	【膵・消化管NET】ｽﾄﾚﾌﾟﾄｿﾞｼﾝ療法(Weekly)	7	ザノサー点滴静注用 1g	1000	mg/m2	○																				
NET	【膵・消化管NET】ｽﾄﾚﾌﾟﾄｿﾞｼﾝ療法(Daily)	42	ザノサー点滴静注用 1g	500	mg/m2	○	○	○	○	○																
胃がん	【胃】CPT11(2週毎)	14	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液「ｻﾜｲ」(40mg、100mg)	150	mg/m2	○																				
胃がん	【胃】Weekly-nabPTX療法	28	【特生】アブラキサン点滴静注用 100mg	100	mg/m2	○							○							○						
胃がん	【胃】ニボルマブ(240)療法	14	ｵﾌｼﾞｰﾎﾞ点滴静注 (20mg、120mg、240mg)	240	mg	○																				
胃がん	【胃】ニボルマブ(480)療法	28	ｵﾌｼﾞｰﾎﾞ点滴静注 (20mg、120mg、240mg)	480	mg	○																				
胃がん	【胃】エンハーツ(1コース目)	21	エンハーツ点滴静注用 100mg	6.4	mg/Kg	○																				
			注射用水【ｼﾞｼﾞﾒﾝ】20ml	0.32	ml/Kg	○																				
胃がん	【胃】エンハーツ(2コース目以降)	21	エンハーツ点滴静注用 100mg	6.4	mg/Kg	○																				
胃がん	【胃】TS-1／CDDP(day8)5週サイクル	28	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	60	mg/m2								○													
			S-1	40 (<1.25m^2) 50 (1.25-1.5m^2) 60 (1.5m^2≦) 1日2回	mg	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服							
胃がん	【胃】CPT-11+CDDP療法	28	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液「ｻﾜｲ」(40mg、100mg)	70	mg/m2	○														○						
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
胃がん	【胃】SOX+ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	21	(後発)ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液(50、100、200mg)「ｻﾜｲ」	130	mg/m2	○																				
			ｵﾌｼﾞｰﾎﾞ点滴静注 (20mg、120mg、240mg)	360	mg	○																				
			S-1	40 (<1.25m^2) 50 (1.25-1.5m^2) 60 (1.5m^2≦) 1日2回	mg	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服							
胃がん	【胃】CapeOX+ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	21	(後発)ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液(50、100、200mg)「ｻﾜｲ」	130	mg/m2	○																				
			ｵﾌｼﾞｰﾎﾞ点滴静注 (20mg、120mg、240mg)	360	mg	○																				
			カペシタビン錠	1000	mg/m2	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服							
胃がん	【胃】m-FOLFOX6	14	(後発)ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液(50、100、200mg)「ｻﾜｲ」	85	mg/m2	○																				
			レボホリナート注【ﾚｼﾞﾒﾝ】100mg	200	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「トーワ」(250、1000mg)	400	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「トーワ」(250、1000mg)	2400	mg/m2	○																				
胃がん	【胃】mFOLFOX6+Nivo	14	(後発)ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液(50、100、200mg)「ｻﾜｲ」	85	mg/m2	○																				
			レボホリナート注【ﾚｼﾞﾒﾝ】100mg	200	mg/m2	○																				
			ｵﾌｼﾞｰﾎﾞ点滴静注 (20mg、120mg、240mg)	240	mg	○																				
			フルオロウラシル注「トーワ」(250、1000mg)	400	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「トーワ」(250、1000mg)	2400	mg/m2	○																				
肝細胞がん	【肝】ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ+ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ療法(初回)	21	アバスチン点滴静注用 (100、400mg)	15	mg/Kg	○																				
			テセントリク点滴静注 1200mg 20ml	1200	mg	○																				
肝細胞がん	【肝】ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ+ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ療法(2回目)	21	アバスチン点滴静注用 (100、400mg)	15	mg/Kg	○																				
			テセントリク点滴静注 1200mg 20ml	1200	mg	○																				
肝細胞がん	【肝】ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ+ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ(3回目以降)	21	アバスチン点滴静注用 (100、400mg)	15	mg/Kg	○																				
			テセントリク点滴静注 1200mg 20ml	1200	mg	○																				
肝細胞がん	【肝】ラムシルマブ療法(1コース目)	14	サイラムザ点滴静注液100mg (100、500mg)	8	mg/Kg	○																				
肝細胞がん	【肝】ラムシルマブ療法(2コース目以降)	14	サイラムザ点滴静注液100mg (100、500mg)	8	mg/Kg	○																				
肝細胞がん	【肝】Durvalumab維持療法 (30kg超)	28	イミフィンジ点滴静注 (120mg、500mg)	1500	mg	○																				
肝細胞がん	【肝】Durva+Treme (30kg超)	28	イミフィンジ点滴静注 (120mg、500mg)	1500	mg	○																				
			イジュド点滴静注 300mg 15ml	300	mg	○																				
食道がん	【食道】ニボルマブ(480)療法	28	ｵﾌｼﾞｰﾎﾞ点滴静注 (20mg、120mg、240mg)	480	mg	○																				
食道がん	【食道】ﾍﾟﾝﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ＋5-FU(維持)	21	フルオロウラシル注「トーワ」(250、1000mg)	800	mg/m2	○	○	○	○	○																
			キイトルーダ点滴静注 100mg 4ml	200	mg	○																				
食道がん	【食道】(維持)ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ療法(3週)	21	キイトルーダ点滴静注 100mg 4ml	200	mg	○																				
食道がん	【食道】(維持)ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ療法(6週)	42	キイトルーダ点滴静注 100mg 4ml	400	mg	○																				
食道がん	【食道】FP1000/75 + RT(50.4Gy)	28	フルオロウラシル注「トーワ」(250、1000mg)	1000	mg/m2	○	○	○	○																	
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	75	mg/m2	○																				
食道がん	【食道】(術前) FP800/80 21日ｻｲｸﾙ	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「トーワ」(250、1000mg)	800	mg/m2	○	○	○	○	○																
食道がん	【食道】(切除不能/再発)FP800/80 28日ｻｲｸﾙ	28	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「トーワ」(250、1000mg)	800	mg/m2	○	○	○	○	○																
食道がん	【食道】FP700/70 + RT(60Gy)	28	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	70	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「トーワ」(250、1000mg)	700	mg/m2	○	○	○	○																	
食道がん	【食道】ﾍﾟﾝﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ＋FP	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「トーワ」(250、1000mg)	800	mg/m2	○	○	○	○	○																
			キイトルーダ点滴静注 100mg 4ml	200	mg	○																				
食道がん	【食道】ニボルマブ(240)療法	14	ｵﾌｼﾞｰﾎﾞ点滴静注 (20mg、120mg、240mg)	240	mg	○																				
食道がん	【食道】Nivo(480)+FP	28	フルオロウラシル注「トーワ」(250、1000mg)	800	mg/m2	○	○	○	○	○																
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
			ｵﾌｼﾞｰﾎﾞ点滴静注 (20mg、120mg、240mg)	480	mg	○																				
食道がん	【食道】Nivo(240)+FP	28	フルオロウラシル注「トーワ」(250、1000mg)	800	mg/m2	○	○	○	○	○																
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
			ｵﾌｼﾞｰﾎﾞ点滴静注 (20mg、120mg、240mg)	240	mg	○														○						
大腸がん	【大腸】ﾍﾟｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ	14	ﾍﾟｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ注 (100mg、400mg)	6	mg/Kg	○																				
大腸がん	【大腸】ｲﾘﾉﾃｶﾝ+ﾍﾟｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ	14	ﾍﾟｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ注 (100mg、400mg)	6	mg/Kg	○																				
			ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液「ｻﾜｲ」(40mg、100mg)	150	mg/m2	○																				
大腸がん	【大腸】ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ(240)療法(MSI-High)	14	ｵﾌｼﾞｰﾎﾞ点滴静注 (20mg、120mg、240mg)	240	mg	○																				
大腸がん	【大腸】IRIS	28	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液「ｻﾜｲ」(40mg、100mg)	125	mg/m2	○														○						
			S-1	40 (<1.25m^2) 50 (1.25-1.5m^2) 60 (1.5m^2≦) 1日2回	mg	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服							
大腸がん	☆【大腸】XELIRI+BEV(1ｸｰﾙ目)	21	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液「ｻﾜｲ」(40mg、100mg)	200	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注 (100、400mg)「第一三共」	7.5	mg/Kg	○																				
			カペシタビン錠	800	mg/m2																					
大腸がん	☆【大腸】XELIRI+BEV(2ｸｰﾙ目)	21	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液「ｻﾜｲ」(40mg、100mg)	200	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注 (100、400mg)「第一三共」	7.5	mg/Kg	○																				
			カペシタビン錠	800	mg/m2	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服							
大腸がん	☆【大腸】XELIRI+BEV(3ｸｰﾙ目以降)	21	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液「ｻﾜｲ」(40mg、100mg)	200	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注 (100、400mg)「第一三共」	7.5	mg/Kg	○																				
			カペシタビン錠	800	mg/m2	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服							
大腸がん	【大腸】アービタックス(2週毎)	14	アービタックス注射液 100mg 20ml	500	mg/m2	○																				
大腸がん	【大腸】ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ+ｲﾘﾉﾃｶﾝ(2週毎)	14	アービタックス注射液 100mg 20ml	500	mg/m2	○																				
			ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液「ｻﾜｲ」(40mg、100mg)	150	mg/m2	○																				
大腸がん	【大腸】アービタックス(1週毎 初回)	7	アービタックス注射液 100mg 20ml	400	mg/m2	○																				
大腸がん	【大腸】アービタックス(1週毎 2回目以降)	7	アービタックス注射液 100mg 20ml	250	mg/m2	○																				

疾患名	レジメン名称	インターバル日数	薬剤名称	標準値(1回量)	単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14	Day 15	Day 16	Day 17	Day 18	Day 19	Day 20	Day 21
大腸がん	【大腸】SOX療法	21	(後発)ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液(50、100、200mg)「ｻﾜｲ」	130	mg/m2	○																				
			S-1	40 (<1.25m^2) 50 (1.25-1.5m^2) 60 (1.5m^2≦) 1日2回	mg	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服							
大腸がん	【大腸】XELOX	21	(後発)ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液(50、100、200mg)「ｻﾜｲ」	130	mg/m2	○																				
			カペシタビン錠	1000	mg/m2	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服							
大腸がん	【大腸】SOX+BEV(1ｸｰﾙ目)	21	(後発)ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液(50、100、200mg)「ｻﾜｲ」	130	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	7.5	mg/Kg	○																				
			S-1	40 (<1.25m^2) 50 (1.25-1.5m^2) 60 (1.5m^2≦) 1日2回	mg	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服							
大腸がん	【大腸】SOX+BEV(2ｸｰﾙ目)	21	(後発)ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液(50、100、200mg)「ｻﾜｲ」	130	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	7.5	mg/Kg	○																				
			S-1	40 (<1.25m^2) 50 (1.25-1.5m^2) 60 (1.5m^2≦) 1日2回	mg	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服							
大腸がん	【大腸】SOX+BEV(3ｸｰﾙ目以降)	21	(後発)ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液(50、100、200mg)「ｻﾜｲ」	130	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	7.5	mg/Kg	○																				
			S-1	40 (<1.25m^2) 50 (1.25-1.5m^2) 60 (1.5m^2≦) 1日2回	mg	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服							
大腸がん	【大腸】XELOX+Bev7.5mg/kg(1ｸｰﾙ目)	21	(後発)ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液(50、100、200mg)「ｻﾜｲ」	130	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	7.5	mg/Kg	○																				
			カペシタビン錠	1000	mg/m2	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服							
大腸がん	【大腸】XELOX+Bev7.5mg/kg(2ｸｰﾙ目)	21	(後発)ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液(50、100、200mg)「ｻﾜｲ」	130	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	7.5	mg/Kg	○																				
			カペシタビン錠	1000	mg/m2	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服							
大腸がん	【大腸】XELOX+Bev7.5mg/kg(3ｸｰﾙ以降)	21	(後発)ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液(50、100、200mg)「ｻﾜｲ」	130	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	7.5	mg/Kg	○																				
			カペシタビン錠	1000	mg/m2	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服							
大腸がん	【大腸】5-FU/LV+BEV5mg/kg(1ｸｰﾙ目)	14	レボホリナート注【ﾚｼﾞﾒﾝ】100mg	200	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	5	mg/Kg	○																				
			フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」(250、1000mg)	2400	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」(250、1000mg)	400	mg/m2	○																				
大腸がん	【大腸】5-FU/LV+BEV5mg/kg(2ｸｰﾙ目)	14	レボホリナート注【ﾚｼﾞﾒﾝ】100mg	200	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	5	mg/Kg	○																				
			フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」(250、1000mg)	2400	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」(250、1000mg)	400	mg/m2	○																				
大腸がん	【大腸】5-FU/LV+BEV5mg/kg3ｸｰﾙ以降	14	レボホリナート注【ﾚｼﾞﾒﾝ】100mg	200	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	5	mg/Kg	○																				
			フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」(250、1000mg)	2400	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」(250、1000mg)	400	mg/m2	○																				
大腸がん	【大腸】FOLFIRI	14	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液「ｻﾜｲ」(40mg、100mg)	150	mg/m2	○																				
			レボホリナート注【ﾚｼﾞﾒﾝ】100mg	200	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」(250、1000mg)	2400	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」(250、1000mg)	400	mg/m2	○																				
大腸がん	【大腸】FOLFIRI+Bev5mg/kg（1ｸｰﾙ目）	14	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液「ｻﾜｲ」(40mg、100mg)	150	mg/m2	○																				
			レボホリナート注【ﾚｼﾞﾒﾝ】100mg	200	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	5	mg/Kg	○																				
			フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」(250、1000mg)	400	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」(250、1000mg)	2400	mg/m2	○																				
大腸がん	【大腸】FOLFIRI+Bev5mg/kg（2ｸｰﾙ目）	14	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液「ｻﾜｲ」(40mg、100mg)	150	mg/m2	○																				
			レボホリナート注【ﾚｼﾞﾒﾝ】100mg	200	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	5	mg/Kg	○																				
			フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」(250、1000mg)	400	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」(250、1000mg)	2400	mg/m2	○																				
大腸がん	【大腸】FOLFIRI+Bev5mg/kg(3ｸｰﾙ以降)	14	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液「ｻﾜｲ」(40mg、100mg)	150	mg/m2	○																				
			レボホリナート注【ﾚｼﾞﾒﾝ】100mg	200	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	5	mg/Kg	○																				
			フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」(250、1000mg)	400	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」(250、1000mg)	2400	mg/m2	○																				
大腸がん	【大腸】m-FOLFOX6+ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ	14	ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ注（100mg、400mg)	6	mg/Kg	○																				
			(後発)ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液(50、100、200mg)「ｻﾜｲ」	85	mg/m2	○																				
			レボホリナート注【ﾚｼﾞﾒﾝ】100mg	200	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」(250、1000mg)	400	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」(250、1000mg)	2400	mg/m2	○																				
大腸がん	【大腸】FOLFIRI+ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ	14	ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ注（100mg、400mg)	6	mg/Kg	○																				
			レボホリナート注【ﾚｼﾞﾒﾝ】100mg	200	mg/m2	○																				
			ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液「ｻﾜｲ」(40mg、100mg)	150	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」(250、1000mg)	400	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」(250、1000mg)	2400	mg/m2	○																				
大腸がん	【大腸】FOLFIRI+ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ療法(1ｺｰｽ目)	14	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液「ｻﾜｲ」(40mg、100mg)	150	mg/m2	○																				
			サイラムザ点滴静注液100mg （100、500mg)	8	mg/Kg	○																				
			レボホリナート注【ﾚｼﾞﾒﾝ】100mg	200	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」(250、1000mg)	400	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」(250、1000mg)	2400	mg/m2	○																				
大腸がん	【大腸】FOLFIRI＋ｱﾌﾘﾍﾞﾙｾﾌﾟﾄ	14	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液「ｻﾜｲ」(40mg、100mg)	150	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」(250、1000mg)	400	mg/m2	○																				
			ザルトラップ点滴静注（100mg、200mg)	4	mg/Kg	○																				
			レボホリナート注【ﾚｼﾞﾒﾝ】100mg	200	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」(250、1000mg)	2400	mg/m2	○																				
大腸がん	【大腸】FOLFIRI+ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ療法(2ｺｰｽ目以降)	14	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液「ｻﾜｲ」(40mg、100mg)	150	mg/m2	○																				
			サイラムザ点滴静注液100mg （100、500mg)	8	mg/Kg	○																				
			レボホリナート注【ﾚｼﾞﾒﾝ】100mg	200	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」(250、1000mg)	400	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」(250、1000mg)	2400	mg/m2	○																				

疾患名	レジメン名称	インターバル日数	薬剤名称	標準値(1回量)	単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14	Day 15	Day 16	Day 17	Day 18	Day 19	Day 20	Day 21
大腸がん	【大腸】m-FOLFOX6+ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ(1ｸｰﾙ目)	14	(後発)ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液(50、100、200mg)「ｻﾜｲ」	85	mg/m2	○																				
			レボホリナート注【ﾚｼﾞﾒﾝ】100mg	200	mg/m2	○																				
			アービタックス注射液 100mg 20ml	400	mg/m2	○																				
			アービタックス注射液 100mg 20ml	250	mg/m2								○													
			フルオロウラシル注「トーワ」(250、1000mg)	2400	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「トーワ」(250、1000mg)	400	mg/m2	○																				
大腸がん	【大腸】m-FOLFOX6+ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ(2ｸｰﾙ目以降)	14	(後発)ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液(50、100、200mg)「ｻﾜｲ」	85	mg/m2	○																				
			レボホリナート注【ﾚｼﾞﾒﾝ】100mg	200	mg/m2	○																				
			アービタックス注射液 100mg 20ml	250	mg/m2	○							○													
			フルオロウラシル注「トーワ」(250、1000mg)	2400	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「トーワ」(250、1000mg)	400	mg/m2	○																				
大腸がん	【大腸】m-FOLFOX6	14	レボホリナート注【ﾚｼﾞﾒﾝ】100mg	200	mg/m2	○																				
			(後発)ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液(50、100、200mg)「ｻﾜｲ」	85	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「トーワ」(250、1000mg)	2400	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「トーワ」(250、1000mg)	400	mg/m2	○																				
大腸がん	【大腸】m-FOLFOX6+Bev5mg/kg(1ｸｰﾙ目)	14	(後発)ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液(50、100、200mg)「ｻﾜｲ」	85	mg/m2	○																				
			レボホリナート注【ﾚｼﾞﾒﾝ】100mg	200	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注 (100、400mg)「第一三共」	5	mg/Kg	○																				
			フルオロウラシル注「トーワ」(250、1000mg)	2400	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「トーワ」(250、1000mg)	400	mg/m2	○																				
大腸がん	【大腸】m-FOLFOX6+Bev5mg/kg(2ｸｰﾙ目)	14	(後発)ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液(50、100、200mg)「ｻﾜｲ」	85	mg/m2	○																				
			レボホリナート注【ﾚｼﾞﾒﾝ】100mg	200	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注 (100、400mg)「第一三共」	5	mg/Kg	○																				
			フルオロウラシル注「トーワ」(250、1000mg)	400	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「トーワ」(250、1000mg)	2400	mg/m2	○																				
大腸がん	【大腸】m-FOLFOX6+Bev5mg/kg(3ｸｰﾙ以降)	14	(後発)ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液(50、100、200mg)「ｻﾜｲ」	85	mg/m2	○																				
			レボホリナート注【ﾚｼﾞﾒﾝ】100mg	200	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注 (100、400mg)「第一三共」	5	mg/Kg	○																				
			フルオロウラシル注「トーワ」(250、1000mg)	400	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「トーワ」(250、1000mg)	2400	mg/m2	○																				
大腸がん	【大腸】m-FOLFOX6+ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ2週	14	アービタックス注射液 100mg 20ml	500	mg/m2	○																				
			(後発)ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液(50、100、200mg)「ｻﾜｲ」	85	mg/m2	○																				
			レボホリナート注【ﾚｼﾞﾒﾝ】100mg	200	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「トーワ」(250、1000mg)	400	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「トーワ」(250、1000mg)	2400	mg/m2	○																				
大腸がん	【大腸】(初回量)ﾊﾞｰｼﾞｪﾀ+ﾄﾗｽｳｽﾞﾏﾌﾞ	21	バージェタ点滴静注420mg/14mL	840	mg	○																				
			ハーセプチン注(60、150mg)(生食なし)	8	mg/Kg	○																				
大腸がん	【大腸】(維持量)ﾊﾞｰｼﾞｪﾀ+ﾄﾗｽｳｽﾞﾏﾌﾞ	21	バージェタ点滴静注420mg/14mL	420	mg	○																				
			ハーセプチン注(60、150mg)(生食なし)	6	mg/Kg	○																				
胆道がん	【胆道】Durvalumab維持(＞30kg)	28	イミフィンジ点滴静注 (120mg、500mg)	1500	mg	○																				
胆道がん	【胆道】Durvalumab維持(≦30kg)	28	イミフィンジ点滴静注 (120mg、500mg)	20	mg/Kg	○																				
胆道がん	【胆道】CDDP+GEM	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	25	mg/m2	○							○													
			(運)ゲムシタビン点滴静注用 (200mg、1g)	1000	mg/m2	○							○													
胆道がん	【胆道】GCS療法(GEM/CDDP/S1)ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾞﾀﾝﾄ	14	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	25	mg/m2	○																				
			(運)ゲムシタビン点滴静注用 (200mg、1g)	1000	mg/m2	○																				
			S-1	40 (<1.25m^2) 50 (1.25-1.5m^2) 60 (1.5m^2≦) 1日2回	mg	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服														
胆道がん	【胆道】Durvalumab+GEM+CDDP(＞30kg)	21	イミフィンジ点滴静注 (120mg、500mg)	1500	mg	○																				
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	25	mg/m2	○							○													
			(運)ゲムシタビン点滴静注用 (200mg、1g)	1000	mg/m2	○							○													
胆道がん	【胆道】Durvalumab+GEM+CDDP(≦30kg)	21	イミフィンジ点滴静注 (120mg、500mg)	20	mg/Kg	○																				
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	25	mg/m2	○							○													
			(運)ゲムシタビン点滴静注用 (200mg、1g)	1000	mg/m2	○							○													
膵がん	【膵】Weekly-nabPTX＋GEM療法	28	【特生】アブラキサン点滴静注用 100mg	125	mg/m2	○							○							○						
			生理食塩液【ﾚｼﾞﾒﾝ用】 100ml	25	ml/m2	○							○							○						
			(運)ゲムシタビン点滴静注用 (200mg、1g)	1000	mg/m2	○							○							○						
膵がん	【膵】FOLFIRINOX(アロカリス使用)	14	(後発)ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液(50、100、200mg)「ｻﾜｲ」	85	mg/m2	○																				
			レボホリナート注【ﾚｼﾞﾒﾝ】100mg	200	mg/m2	○																				
			ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液「ｻﾜｲ」(40mg、100mg)	180	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「トーワ」(250、1000mg)	400	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「トーワ」(250、1000mg)	2400	mg/m2	○																				
膵がん	【膵】nal-IRI＋5FU/LV療法	14	オニバイド点滴静注 43mg 10ml	70	mg/m2	○																				
			レボホリナート注【ﾚｼﾞﾒﾝ】100mg	200	mg/m2	○																				
			フルオロウラシル注「トーワ」(250、1000mg)	2400	mg/m2	○																				