疾患名	レジメン名称	インターバル日数	薬剤名称	標準値(1回量)	単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14	Day 15
骨肉腫	【骨肉腫】NECO-95(ADR単独)療法	21	ドキソルビシン注「NK」(10、50mg)	30	mg/m2	○	○	○												
骨肉腫	【骨肉腫】NECO-95(AP)療法	21	ドキソルビシン注「NK」(10、50mg)	30	mg/m2	○	○													
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	120	mg/m2	○														
骨肉腫	IFO＋ADR	21	イホマイド注 1g	2	g/m2	○	○	○	○	○										
			ドキソルビシン注「NK」(10、50mg)	30	mg/m2	○	○													
			ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注【ﾚｼﾞﾒﾝ】400mg 4ml	400	mg/m2	○	○	○	○	○										
骨肉腫	【骨肉腫】NECO-95(IFO)療法	21	イホマイド注 1g	2	g/m2	○														
			ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注【ﾚｼﾞﾒﾝ】400mg 4ml	1200	mg/m2	○														
			イホマイド注 1g	2	g/m2		○	○	○	○	○	○								
			ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注【ﾚｼﾞﾒﾝ】400mg 4ml	1200	mg/m2		○	○	○	○	○	○								
			イホマイド注 1g	2	g/m2	○														
			ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注【ﾚｼﾞﾒﾝ】400mg 4ml	1200	mg/m2	○														
			ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注【ﾚｼﾞﾒﾝ】400mg 4ml	1200	mg/m2								○							
悪性軟部肉腫	【ESFT】VDC/IE交替療法(IE)	21	イホマイド注 1g	1.8	g/m2	○	○	○	○	○										
			エトポシド点滴静注液100mg「ｻﾝﾄﾞ」5ml	100	mg/m2	○	○	○	○	○										
			ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注【ﾚｼﾞﾒﾝ】400mg 4ml	360	mg/m2	○	○	○	○	○										
悪性軟部肉腫	【ESFT】VDC/IE交替療法(VDC)	21	ドキソルビシン注「NK」(10、50mg)	37.5	mg/m2	○	○													
			オンコビン注 1mg	1.5	mg/m2	○														
			エンドキサン注(100、500mg)	1200	mg/m2	○														
			ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注【ﾚｼﾞﾒﾝ】400mg 4ml	480	mg/m2	○														
悪性軟部肉腫	VDC/IE交替療法(VDC)14日	14	ドキソルビシン注「NK」(10、50mg)	37.5	mg/m2	○	○													
			オンコビン注 1mg	1.5	mg/m2	○														
			エンドキサン注(100、500mg)	1200	mg/m2	○														
			ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注【ﾚｼﾞﾒﾝ】400mg 4ml	480	mg/m2	○														
悪性軟部肉腫	VDC/IE交替療法(IE)14日	14	イホマイド注 1g	1.8	g/m2	○	○	○	○	○										
			エトポシド点滴静注液100mg「ｻﾝﾄﾞ」5ml	100	mg/m2	○	○	○	○	○										
			ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注【ﾚｼﾞﾒﾝ】400mg 4ml	360	mg/m2	○	○	○	○	○										
悪性軟部肉腫	【悪性軟部腫瘍】トラベクテジン療法	21	ヨンデリス点滴静注用(0.25mg、1mg)	1.2	mg/m2	○														
骨肉腫	【骨肉腫】NECO-95J(MTX大量)療法	7	レボホリナート注【ﾚｼﾞﾒﾝ】100mg	7.5	mg		○	○	○											
			<新3>メソトレキセート注(50mg、200mg、1000mg)	10000	mg/m2	○														
悪性軟部肉腫	【悪性軟部腫瘍】ハラヴェン	21	ハラヴェン静注 1mg 2ml	1.4	mg/m2	○							○							
悪性軟部肉腫	【骨軟部肉腫】ADR単独療法	21	ドキソルビシン注「NK」(10、50mg)	25	mg/m2	○	○	○												
横紋筋肉腫	【横紋筋肉腫】ドキソルビシン単剤	21	ドキソルビシン注「NK」(10、50mg)	60	mg/m2	○														
横紋筋肉腫	VAC療法	21	オンコビン注 1mg	1.5	mg/m2	○							○							○
			コスメゲン注 0.5mg	1.35	mg/m2	○														
			エンドキサン注(100、500mg)	2200	mg/m2	○														
			ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注【ﾚｼﾞﾒﾝ】400mg 4ml	880	mg/m2	○														