疾患名	レジメン名称	インターバル日数	薬剤名称	標準値(1回量)	単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14	Day 15	Day 16	Day 17	Day 18	Day 19	Day 20	Day 21	Day 22	Day 23	Day 24	Day 25	Day 26	Day 27	Day 28	Day 29	Day 30	Day 31	Day32	-	Day 36
膵がん	(膵)TS-1/Gem療法	21	(注)ゲムシタビン点滴静注用(200mg、1g)	800	mg/m2								○														○												
			エスワンタイホウOD錠T(20mg、25mg)	40 (<1.25m^2) 50 (1.25-1.5m^2) 60 (1.5m^2≦) 1日2回	mg	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服													
肛門管がん	【肛門】5FU+MMC+RT	45	マイトマイシン注用 (2、10mg)	10	mg/m2	○																												○					
			フルオロウラシル注ﾌﾙｰﾀｼ(250、1000mg)	1000	mg/m2	○	○	○	○																									○	○	○	○		
食道がん	【食道】ｾﾋﾞﾘﾑﾏﾌﾞ+ﾆｰﾎﾞﾙﾏﾌﾞ(240mg)療法	42	オプソーキ点滴静注 (20mg、120mg、240mg)	240	mg	○														○														○					
			ヤーボイ点滴静注液(20mg、50mg)	1	mg/Kg	○																																	
食道がん	【食道】Weekly PTX(6投1休)	49	(注)パクリタキセル点滴静注液「ネスピータ」(30、100mg)	100	mg/m2	○							○							○							○							○					○
食道がん	【食道】ｾﾋﾞﾘﾑﾏﾌﾞ+ﾆｰﾎﾞﾙﾏﾌﾞ(360mg)療法	42	オプソーキ点滴静注 (20mg、120mg、240mg)	360	mg	○																					○												
			ヤーボイ点滴静注液(20mg、50mg)	1	mg/Kg	○																																	