

疾患名	レジメン名称	インターバル日数	薬剤名称	標準値(1回量)	単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14	Day 15	Day 16	Day 17	Day 18	Day 19	Day 20	Day 21	
乳がん	【乳】ハラヴェン	21	ハラヴェン 静注 1mg/2ml	1.4	mg/m ²	○							○														
乳がん	【乳】イリノテカン	35	イリノテカン塩酸塩点滴静注液「サリ」(40mg、100mg)	100	mg/m ²	○							○														
乳がん	【乳】カドサイラ(初回)	21	カドサイラ点滴静注用 (100、160mg)	3.6	mg/Kg	○																					
乳がん	【乳】カドサイラ(2回目以降)	21	カドサイラ点滴静注用 (100、160mg)	3.6	mg/Kg	○																					
乳がん	【乳】(初回量)ハーゼータ+トラスズマブ	21	ハーゼータ点滴静注420mg/14mL トラスズマブBS点滴静注用 (60、150mg)	840 8	mg mg/Kg	○ ○																					
乳がん	【乳】(維持量)ハーゼータ+トラスズマブ	21	ハーゼータ点滴静注420mg/14mL トラスズマブBS点滴静注用 (60、150mg)	420 6	mg mg/Kg	○ ○																					
乳がん	【乳】ハーゼータ+トラスズマブ+DTX75(2回目以降)	21	ハーゼータ点滴静注420mg/14mL トラスズマブBS点滴静注用 (60、150mg) ドセタキセル点滴静注「エフD」(20、80mg)	420 6 75	mg mg/Kg mg/m ²	○ ○ ○																					
乳がん	【乳】DTX75+CBDC+HER療法(初回)	21	ハーゼータ点滴静注420mg/14mL トラスズマブBS点滴静注用 (60、150mg) ドセタキセル点滴静注「エフD」(20、80mg) カルボフラチン注「サド」(50、150mg、450mg)	840 6 75 6	mg mg/Kg mg/m ² (AUC)	○ ○ ○ ○							○								○						
乳がん	【乳】DTX75+CBDC+HER療法(2コース目以降)	21	ハーゼータ点滴静注420mg/14mL トラスズマブBS点滴静注用 (60、150mg) ドセタキセル点滴静注「エフD」(20、80mg)	840 6 75	mg mg/Kg mg/m ²	○ ○ ○																					
乳がん	【乳】TCHP療法(1コース目)	21	ハーゼータ点滴静注420mg/14mL ドセタキセル点滴静注「エフD」(20、80mg) カルボフラチン注「サド」(50、150mg、450mg) トラスズマブBS点滴静注用 (60、150mg)	840 75 6 8	mg mg/m ² (AUC) mg/Kg	○ ○ ○ ○																					
乳がん	【乳】TCHP療法(2回目以降)	21	ハーゼータ点滴静注420mg/14mL ドセタキセル点滴静注「エフD」(20、80mg) カルボフラチン注「サド」(50、150mg、450mg) トラスズマブBS点滴静注用 (60、150mg)	420 75 6 8	mg mg/m ² (AUC) mg/Kg	○ ○ ○ ○																					
乳がん	【乳】ハーゼータ+トラスズマブ+DTX75(1コース目)	21	ハーゼータ点滴静注420mg/14mL トラスズマブBS点滴静注用 (60、150mg) ドセタキセル点滴静注「エフD」(20、80mg)	420 8 75	mg mg/Kg mg/m ²	○ ○ ○																					
乳がん	【乳】BEV+ハクワキセル(初回)	28	ペバシズマブBS点滴静注 (100、400mg)「第一三共」 ペバシズマブBS点滴静注 (100、400mg)「第一三共」 (連)ハクワキセル点滴静注液「ネスエー」(30、100mg)	10 10 90	mg/Kg mg/Kg mg/m ²	○ ○ ○							○								○						
乳がん	【乳】BEV+ハクワキセル(2回目以降)	28	ペバシズマブBS点滴静注 (100、400mg)「第一三共」 (連)ハクワキセル点滴静注液「ネスエー」(30、100mg)	10 90	mg/Kg mg/m ²	○ ○							○								○						
乳がん	【乳】ハーゼータ+トラスズマブ+w-PTX(2回目～)	21	ハーゼータ点滴静注420mg/14mL (連)ハクワキセル点滴静注液「ネスエー」(30、100mg)	420 80	mg mg/m ²	○ ○							○								○						
乳がん	【乳】ハーゼータ+HER+w-PTX(1コース目)	21	ハーゼータ点滴静注420mg/14mL トラスズマブBS点滴静注用 (60、150mg) (連)ハクワキセル点滴静注液「ネスエー」(30、100mg)	840 8 80	mg mg/Kg mg/m ²	○ ○ ○															○						
乳がん	【乳】GEM+PTX	21	(連)ハクワキセル点滴静注液「ネスエー」(30、100mg) (連)エムシエン点滴静注用 (200mg、1g) トラスズマブBS点滴静注用 (60、150mg)	80 175 4	mg/m ² mg/m ² mg/Kg	○ ○ ○							○								○						
乳がん	【乳】W-PTX/W-T-mab療法(adjutant)1コース目	21	トラスズマブBS点滴静注用 (60、150mg) (連)ハクワキセル点滴静注液「ネスエー」(30、100mg)	4 80	mg/Kg mg/m ²	○ ○								○							○						
乳がん	【乳】W-PTX/3W-T-mab療法(adjutant)1コース目	21	トラスズマブBS点滴静注用 (60、150mg) (連)ハクワキセル点滴静注液「ネスエー」(30、100mg)	8 80	mg/Kg mg/m ²	○ ○								○							○						
乳がん	【乳】W-PTX/W-T-mab療法(adjutant)2コース～	21	トラスズマブBS点滴静注用 (60、150mg) (連)ハクワキセル点滴静注液「ネスエー」(30、100mg)	8 80	mg/Kg mg/m ²	○ ○								○							○						
乳がん	【乳】W-PTX/3W-T-mab療法(adjutant)2コース～	21	トラスズマブBS点滴静注用 (60、150mg) (連)ハクワキセル点滴静注液「ネスエー」(30、100mg)	8 80	mg/Kg mg/m ²	○ ○								○							○						
乳がん	【乳】3W毎投与：PTX/T-mab療法(1コース目)	21	トラスズマブBS点滴静注用 (60、150mg) ハクワキセル注「NK」(30、100mg)	8 175	mg/Kg mg/m ²	○ ○																					
乳がん	【乳】3W毎投与：PTX/T-mab療法(2コース以降)	21	トラスズマブBS点滴静注用 (60、150mg) ハクワキセル注「NK」(30、100mg)	8 175	mg/Kg mg/m ²	○ ○																					
乳がん	【乳】W-PTX/W-T-mab療法(再発)1コース目	28	トラスズマブBS点滴静注用 (60、150mg) (連)ハクワキセル点滴静注液「ネスエー」(30、100mg)	8 80	mg/Kg mg/m ²	○ ○								○							○						
乳がん	【乳】W-PTX/W-T-mab療法(再発)2コース以降	28	トラスズマブBS点滴静注用 (60、150mg) (連)ハクワキセル点滴静注液「ネスエー」(30、100mg)	8 80	mg/Kg mg/m ²	○ ○								○							○						

