

高カリウム血症改善剤フォーミュラリ

第一選択薬	第二選択薬
<p>【禁忌】</p> <ul style="list-style-type: none">腸閉塞の患者 <p>ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20% 分包25g「三和」 [薬価：216.0]</p> <p>カリメート®経口液20% [薬価：216.0]</p> <p>※特に使用が推奨される患者</p> <ul style="list-style-type: none">水分制限患者（水なしでも投与が可能）	<p>【推奨される場合】</p> <ul style="list-style-type: none">第一選択薬でカリウム低下作用が不十分な場合第一選択薬で便秘等の消化器症状のある患者高Ca血症の患者で、第一選択薬（Ca含有製剤）の投与が適さない患者 <p>ケイキサレート®ドライシロップ 76% [薬価：415.9]</p> <p>※特徴・注意点</p> <ul style="list-style-type: none">経管投与可能重大な副作用として「心不全誘発（頻度不明）」がある。ナトリウム摂取を制限するなど注意すること。 <p>ロケルマ®懸濁用散分包5g [薬価：（開始用量）6,252.6（維持用量）1,042.1]</p> <p>※特徴・注意点</p> <ul style="list-style-type: none">経口投与でも早期にカリウム低下作用が期待できる本剤1包中に0.4gのナトリウム（食塩として1.0g）含有

※薬価は1日服用量の最低薬価を記載

【補足】

- 本フォーミュラリは、高カリウム血症に対して高カリウム血症改善剤を選択する場合は対象です。他の治療法（グルコース・インスリン療法（GI療法）、カルシウム製剤投与、血液透析等）を含めた治療選択につきましては、患者の病態や各種ガイドラインを参考にご検討ください。
- ロケルマ®を1回10g 1日3回投与する場合には、3日目の投与前に血清カリウム値が治療目標値に達していないことを確認すること。