

疾患名	レジメン名称	インターバル日数	薬剤名称	標準値(1回量)	単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
有棘細胞がん	CA療法	28	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	0	mg		○					
			ドキシソルピシン注「NK」(10、50mg)	0	mg			○				
有棘細胞がん	CA療法(ショートハイドレーション)	28	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	60	mg/m2	○						
			ドキシソルピシン注「NK」(10、50mg)	30	mg/m2		○					
皮膚T細胞リンパ腫	【CTCL】モガムリスマブ(1-5回目)	7	ポテリジオ点滴静注 20mg 5ml	1	mg/Kg	○						
皮膚T細胞リンパ腫	【CTCL】モガムリスマブ(6回目以降)	14	ポテリジオ点滴静注 20mg 5ml	1	mg/Kg	○						
悪性黒色腫	【悪性黒色腫】ヒリムマブ+ニボルマブ療法	21	ヤーボイ点滴静注液(20mg、50mg)	3	mg/Kg	○						
			オプジーボ点滴静注 (20mg、120mg、240mg)	80	mg	○						
メルケル細胞癌	【メルケル細胞癌】アベルマブ療法	14	バベンチオ点滴静注 200mg 10ml	10	mg/Kg	○						
悪性黒色腫	【悪性黒色腫】ニボルマブ療法(240mg)	14	オプジーボ点滴静注 (20mg、120mg、240mg)	240	mg	○						
悪性黒色腫	【悪性黒色腫】ニボルマブ療法(480mg)	28	オプジーボ点滴静注 (20mg、120mg、240mg)	480	mg	○						
悪性黒色腫	【悪性黒色腫】ヘムブロリスマブ(3週毎)療法	21	キイトルーダ点滴静注 100mg 4ml	200	mg	○						
悪性黒色腫	【悪性黒色腫】ヘムブロリスマブ(6週毎)療法	42	キイトルーダ点滴静注 100mg 4ml	400	mg	○						
悪性黒色腫	【悪性黒色腫】イビリムマブ療法	21	ヤーボイ点滴静注液(20mg、50mg)	3	mg/Kg	○						